

Supplementary Table 4. Patient reported outcome scores by lateral extra-articular tenodesis fixation location.

Author (Year)	Lysholm (range)	IKDC (range)
Proximal fixation studies		
Ahn et al ² (2021)	--	93.3 ± 5.2 (50.9 - 68.2)
Akmese et al ³ (2021)	95.6 ± 2.4	78.4 ± 10.1
Declercq et al ¹¹ (2022)	87.8 ± 12.8	86.3 ± 13.8
Getgood et al ²² (2020)	--	87.3 ± 0.8
Jacquet et al ³¹ (2021)	BTB+LET: 89.5 ± 4.8 Quad+LET: 90.1 ± 13.3	--
Jorgensen et al ³³ (2001)	99 (57-100)	--

Rowan et al⁴⁹ (2019)

98 (75 - 100)

--

Trichine et al⁵⁴ (2014)

--

87

Distal Fixation Studies

Di Sarsina et al⁴⁸ (2019)

(95-100)

--

Feller et al¹⁶ (2021)

--

92 (75-100)

Grassi et al²⁴ (2021)

94.1 ± 10.8

--

Lanzetti et al³⁷ (2020)

95 (77-100)

95 (78-100)

Pernin et al⁴⁴ (2010)

--

74.7 ± 18.6

Porter et al⁴⁵ (2020)

96.8 ± 8.0

94.2 ± 11.2

Zaffagnini et al⁶² (2017)

85.7 ± 14.6

--

Soft-Tissue Fixation Studies

Dandy et al ¹⁰ (1994)	91.2 (45-100)	--
Declercq et al ¹¹ (2022)	91.9 ± 8	87.3 ± 11.7
Ferretti et al ¹⁷ (2011)	96 (81-100)	94 (66-100)
Guzzini et al ²⁵ (2016)	91 ± 2.3	87.1 ± 13
Ibrahim et al ²⁹ (1999)	94.9 (71-100)	--
Kocher et al ³⁶ (2018)	93.4 ± 9.9	93.3 ± 11
Mahmoud et al ³⁸ (2022)	84.2 ± 15.1	78 ± 18
Rackemann et al ⁴⁶ (1991)	95.4 (43-100)	--
Wilson et al ⁵⁸ (2019)	--	91.2 (46.7-100)
Vadala et al ⁵⁵ (2013)	95.8 ± 4	89 ± 1.5 (61-100)

Viglietta et al⁵⁶ (2022)

96.8 ± 3.6

96 ± 3.1